



**UNIVERSIDAD
DEL AZUAY**

FACULTAD DE MEDICINA

Título:

“Parasitosis delirante: revisión sistemática de reportes de casos y análisis psicopatológico”

Trabajo de titulación previo a la obtención de título de médico

Autores:

Diego Nicolás Aguirre González

Carlos Nicolás Rojas Polo

Director:

Dr. Iván David Pinzón Yazo

Cuenca - Azuay

2025

RESUMEN

La parasitosis delirante es una entidad infrecuente en la que persiste la idea falsa de padecer una infección por organismos vivos. Por su diversidad en su presentación clínica, su psicopatología no es clara. **Objetivo:** Dilucidar los atributos de la parasitosis delirante para identificar las características psicopatológicas y las comorbilidades asociadas. **Métodos:** Se realizó una revisión sistemática de la literatura en PubMed, ScienceDirect y Bireme sobre los casos publicados. Se analizó según la psicopatología propuesta por el Dr. Berrios. Mediante el software SPSS se realizó un análisis estadístico. **Resultados:** Se incluyeron 79 artículos (87 casos en total). El 65% fue de sexo femenino y la edad promedio fue 57,48 años. Las comorbilidades psiquiátrica y médica más reportadas fueron depresión mayor y daño cerebral respectivamente. El tiempo de evolución promedio fue de 3,25 años. La presencia de sensaciones de escozor, mordedura y/o formicación estuvo en un 73,3%. El mecanismo relacionado con daño orgánico con delirios secundarios fue el más reportado (n = 25); en cambio, el deterioro cognitivo fue el síndrome más común (n = 25). El aislamiento social fue la complicación más frecuente. **Conclusión:** Esta revisión evidencia la heterogeneidad de la parasitosis delirante. Según la clasificación del Dr. Berrios, el daño orgánico fue el mecanismo psicopatológico más frecuente y el deterioro cognitivo el síndrome más encontrado. Destaca el papel de la dopamina y el uso de sustancias en su patogenia. De esta forma, se resalta la importancia de un análisis clínico integral y multidisciplinario de esta entidad.

Palabras clave: Parasitosis delirante, Síndrome de Ekbom, Infestación delirante, Psicopatología, Comorbilidades.

ABSTRACT

Delusional parasitosis is a rare entity in which the false idea of being infected by living organisms persists. Because of its diversity in clinical presentation, its psychopathology is unclear. **Objective:** To elucidate the attributes of delusional parasitosis in order to identify psychopathological features and associated comorbidities. **Methods:** A systematic literature review was performed in PubMed, ScienceDirect and Bireme on published cases. It was analyzed according to the psychopathology proposed by Dr. Berrios. Statistical analysis was performed using SPSS software. **Results:** 79 articles were included (87 cases in total). 65% percent were female and the mean age was 57,48 years. The most reported psychiatric and medical comorbidities were major depression and brain damage respectively. The average time of evolution was 3,25 years. The presence of stinging, biting and/or formication sensations was 73,3%. The mechanism related to organic damage with secondary delirium was the most reported (n = 25); in contrast, cognitive impairment was the most common syndrome (n = 25). Social isolation was the most frequent complication. **Conclusion:** This review evidences the heterogeneity of delusional parasitosis. According to Dr. Berrios' classification, organic damage was the most frequent psychopathological mechanism and cognitive impairment the most frequently encountered syndrome. The role of dopamine and substance use is highlighted.

Key words: Delusional parasitosis, Ekbom's syndrome, Delusional infestation, Psychopathology, Comorbidities.